


Entscheidungshilfe bei chirurgischem Eingriff wegen krankhafter Fettleibigkeit

© 2004 Univ. Doz. Dr. K. Müller
Vorstand der Salzburg Obesity
Academy Foundation –
Qualitätsnetzwerk Übergewicht
Vorstand der chirurgischen
Abteilung
Krankenhaus Hallein

Magenband



3-4 Tage

14 - 21 Tage

0,1 %

Postoperative Komplikationen während des Krankenhausaufenthalts (* Literaturangaben)

1-2 %

5 - 6 %

Bandrutschen
Bandeinwanderung in d. Magen
Infektion
Speiseröhrentzündung
Vormagenerweiterung
Bandundichtigkeit

sehr grosse Umstellung

viel Zeit notwendig

ca 60 % vom Übergewicht

15 - 20 %

24 - 36 Monate

junge Patienten bevorzugt

Zu jedem Zeitpunkt nach der OP
keine Schwierigkeiten


Bei vorhandener Essstörung nicht
empfohlen oder Bereitschaft zur
begleitenden psychologischen
Betreuung

2- 3 x pro Woche empfohlen

Eiweismangel möglich

Erfordert oft viel Geduld häufig
Kontrollen

Magenbypass



Aufenthalt im Krankenhaus nach OP

5-6 Tage

Krankenstand nach OP

14 - 21 Tage

Risiko einer tödlichen Komplikation (* Literaturangaben)

0,3 %

Langzeitkomplikationen (* Literaturangaben)

3 - 4 %

mögliche Komplikationen

Magengeschwür
Magen-Dünndarmverbindungsenge
(Stomastenose)
Darmverschluss durch innere Hernie
gelegentlich Bauchschmerzen

Umstellung des Essverhaltens

Umstellung etwas geringer

Zeit beim Essen

etwas weniger Zeit erforderlich

Gewichtsverlust (* Literaturangaben)

ca. 70 - 80 % vom Übergewicht

5 - 10 %

9 - 12 Monate

Alter

ältere Patienten bevorzugt

Schwangerschaft

Unbedingt 1 Jahr sichere Empfängnisverhütung

vorhandene Essstörung?

Bei vorhandener Essstörung ist es mit dem
Magenbypass etwas leichter zu leben

Vitamine und Mineralien

täglich unbedingt notwendig

Mangelerscheinungen?

Eisenmangel moeglich

ambulante postoperative Betreuung

üblicherweise einfach und kurz (1 x / Jahr Blut- und
allg. Untersuchung)

Magenschrittmacher



1 Tag

5 - 6 Tage

0 %

0,5 - 1 %

1 %

Wundinfektion
Verrutschen der Sonde

Umstellung etwas geringer

zeitunabhängig

ca. 32 % vom Übergewicht

noch keine Daten

noch keine Daten

noch keine Daten

Zu jedem Zeitpunkt nach der OP
keine Schwierigkeiten

Bei vorhandener Essstörung nicht
empfohlen oder Bereitschaft zur
begleitenden psychologischen
Betreuung

nicht erforderlich

üblicherweise keine
Mangelerscheinungen

Erfordert oft viel Geduld häufig
Kontrollen